

1/9




Fig. 1

BEST AVAILABLE COPY

2/9




Fig. 2

BEST AVAILABLE COPY

3/9

	Chymotrypsin, aminopeptidases (Ala-Ala-Phe- MCA)	Chymotrypsin (suc-Ala-Ala- Pro-Phe-MCA)	Chymotrypsin, calpain, papain, protéasome (Suc-Leu-Leu- Val-Tyr-MCA)	Trypsin, papain (Bz-Arg-MCA)
PI	% Inhibition			
PMSF	49,3	72,6	56,6	8,4
Aprotinin	2,8	46,5	16,6	12,5
Chymostatin	93,7	94,6	97,9	22,7
AACT	0,1	0	11,4	1,4
SBTI	1,2	5,7	0	0
Leupeptin	3,3	3,4	33,7	99,8
Pepstatin	0,6	5	0	5,1
CDI	0,5	7,4	0	1,6
E-64	0,1	0	24,9	63,4
OCI	0,4	0	22,1	0
CC2	0	0,2	12,2	0
PMC8	0	0,4	10,3	0,4

Fig. 3

4/9

	Chymotrypsin, aminopeptidases (Ala-Ala-Phe- MCA)	Chymotrypsin (suc-Ala-Ala- Pro-Phe-MCA)	Chymotrypsin, calpain, papain, protéasome (Suc-Leu-Leu- Val-Tyr-MCA)	Trypsin, papain (Bz-Arg-MCA)
PI	% inhibition			
PMSF	9,5	78,2	61,8	8,5
Aprotinin	7,7	0,5	0	9,1
Chymostatin	78,2	75,3	91,2	25,6
AACT	1,5	0	0	3
SBTI	4	0	0	0
Leupeptin	4,1	14,3	27,3	99,6
Pepstatin	5,1	7,9	0	6,5
CDI	3,9	2,7	0	0,5
E-64	7,2	0	0	44,9
OCI	4,5	0	0	0
CC2	1	0	0	0
PMC8	3,7	0	0	0

Fig. 4

5/9





Fig. 5

BEST AVAILABLE COPY

6/9




Fig. 6

7/9




Fig. 7

BEST AVAILABLE COPY

8/9





Fig. 8

9/9

1. Transgenic
(in planta)2. Cell breakage
(extraction medium)

Legend :



Protease



Protease inhibitor



Recombinant protein



/ or \ Degraded recombinant protein

Fig. 9

BEST AVAILABLE COPY